

**Indikatorer og standarder for Den Nationale Skizofrenidatabase.** Opdateret 14. marts 2024.

Indikatorområde	Indikator	Type	Standard
<b>Udredning</b>	1a: Andelen af incidente patienter, som udredes for psykopatologi og interviewes med diagnostisk instrument (SCAN, PSE eller KIDDI-SADS for børn/unge)	Proces	≥ 90%
	1b: Andelen af incidente patienter under 35 år der, inden for 2 år fra diagnosedato, får foretaget kognitiv testning ved psykolog	Proces	≥ 80%
	1c: Andelen af incidente patienter under 35 år der, inden for 2 år fra diagnosedato, får foretaget socialkognitiv testning ved psykolog	Proces	≥ 80%
	1d: Andelen af incidente patienter, som udredes for sociale støttebehov	Proces	≥ 90%
<b>Familieintervention</b>	2: Andelen af incidente patienter, hvor pårørende, indenfor 2 år fra diagnosedato, deltager i familieintervention	Proces	≥ 90%
<b>Psykoedukation</b>	3: Andelen af incidente patienter der, indenfor 2 år fra diagnosedato, påbegynder psykoedukation i manualiserede forløb	Proces	≥ 90%
<b>Medicinsk behandling</b>	4a: Andelen af patienter, som er i medicinsk antipsykotisk behandling	Proces	Ingen
	4b: Andelen af patienter i medicinsk antipsykotisk behandling, som får mere end ét antipsykotikum	Proces	≤ 20%
	4c: Andelen af patienter, som får benzodiazepiner inklusiv benzodiazepinlignende midler (zolpidem, zopiclon, zaleplon)	Proces	≤ 20%
<b>Bivirkninger</b>	5a: Andelen af patienter i medicinsk antipsykotisk behandling, som har fået vurderet status for neurologiske bivirkninger	Proces	≥ 90%
	5b: Andelen af patienter i medicinsk antipsykotisk behandling, som har fået vurderet status for søvn- og sedationsbivirkninger	Proces	≥ 90%
	5c: Andelen af patienter i medicinsk antipsykotisk behandling, som har fået vurderet status for seksuelle bivirkninger	Proces	≥ 90%
<b>Behandling af kardiovaskulære risikofaktorer</b>	6a: Andelen af patienter med forhøjet langtidsblodsukker, som er i antidiabetisk behandling	Resultat	≥ 90%
	6b: Andelen af patienter med hjertekarsygdom/diabetes og forhøjet LDL-kolesterol, som er sat i behandling med lipidsænkende lægemiddel	Resultat	≥ 90%
<b>Selv mord/selv mordsforsøg</b>	7: Andelen af patienter, som begår selvmord eller sandsynligt selvmordsforsøg indenfor 30 dage efter udskrivelse/ambulant kontakt	Resultat	Afventer
<b>Kompositte proceskvalitetsindikatorer</b>	8: Vedr. udredning: Andelen af det samlede antal underindikatorer (1a, 1b, 1c, 1d) for indikator 1, der blev opfyldt		-
	9: Vedr. alle indikatorer der opgør incidente patienter: Andelen af det samlede antal underindikatorer (1a, 1b, 1c, 1d, 2 og 3) for indikator 1-3, der blev opfyldt		-
<b>PRO-indikatorer (opgøres kun i Region Nordjylland)</b>	10: Andelen af patienter, der opnår en forbedring i trivsel	Resultat	Afventer
	11: Andelen af patienter, der opnår en forbedring af fysisk helbred	Resultat	Afventer
	12: Andelen af patienter, der opnår en forbedring af psykisk helbred	Resultat	Afventer
	13: Andelen af patienter, der opnår en forbedring i forhold til at arbejde/uddanne sig	Resultat	Afventer
	14: Andelen af patienter, der opnår en forbedring i forhold til at kunne holde sit hjem	Resultat	Afventer
	15: Andelen af patienter, der opnår en forbedring i forhold til at gøre noget sammen med andre	Resultat	Afventer
	16: Andelen af patienter, der opnår en forbedring i forhold til at foretage sig noget alene	Resultat	Afventer
17: Andelen af patienter, der opnår en forbedring i forhold til at indgå eller opretholde nære relationer	Resultat	Afventer	