

Indikatorer for (Dansk Prostatacancer Database) DaProCa database

Indikatorområde	Indikator	Indikatortype	Standard
Indlæggeshyppighed	Indikator 1: Andel af udførte transrektal ultralydsscanning (TRUS) med prostatabiopsi, der har medført indlæggelse indenfor 7 dage efter proceduren	Proces	≤ 5 % bør opfylde indikatoren
Active Surveillance	Indikator 2a: Andel af nydiagnosticerede patienter under "active surveillance", som er uden events efter 1 år	Proces	≥ 90 % bør opfylde indikatoren
	Indikator 2b: Andel af nydiagnosticerede patienter under "active surveillance", som er uden events efter 3 år	Proces	≥ 70 % bør opfylde indikatoren
Positiv kirurgisk margin (pT2)	Indikator 3: Andel af radikalt prostatektomerede (pT2) patienter med positiv kirurgisk margin	Resultat	≤ 15 % bør opfylde indikatoren
Positiv kirurgisk margin (pT3)	Indikator 4: Andel af radikalt prostatektomerede (pT3) patienter med positiv kirurgisk margin	Resultat	≤ 30 % bør opfylde indikatoren
Morbiditet 30 dage	Indikator 5: Andel af patienter genindlagt indenfor 30 dage efter radikal prostatektomi	Resultat	≤ 5 % bør opfylde indikatoren
Postoperativ Morbiditet	Indikator 6: Andel af radikalt prostatektomerede patienter der har været indlagt mere end 3 dage postoperativt	Resultat	≤5 % bør opfylde indikatoren
Mortalitet	Indikator 7: Andel af prostatektomerede patienter som dør indenfor 1 år efter operation	Resultat	< 1 % bør opfylde indikatoren
Datakomplethed	Indikator 8: Andel diagnosticerede patienter med PSA, kardinalsymptomer og cTNM-oplysninger angivet i DaProCadata diagnoseskemaet	Proces	≥90 % bør opfylde indikatoren

