

## Indikatorer for (Dansk Prostatacancer Database) DaProCa database

Indikatorområde	Indikator	Indikatortype	Standard
<b>Indlæggeshyppighed</b>	<b>Indikator 1:</b> Andel af udførte transrektal ultralydsscanning (TRUS) med prostatabiopsi, der har medført indlæggelse indenfor 7 dage efter proceduren	Proces	≤ 5 % bør opfylde indikatoren
<b>Active Surveillance</b>	<b>Indikator 2a:</b> Andel af nydiagnosticerede patienter under "active surveillance", som er uden events efter 1 år	Proces	≥ 90 % bør opfylde indikatoren
	<b>Indikator 2b:</b> Andel af nydiagnosticerede patienter under "active surveillance", som er uden events efter 3 år	Proces	≥ 70 % bør opfylde indikatoren
<b>Positiv kirurgisk margin (pT2)</b>	<b>Indikator 3:</b> Andel af radikalt prostatektomerede (pT2) patienter med positiv kirurgisk margin	Resultat	≤ 15 % bør opfylde indikatoren
<b>Positiv kirurgisk margin (pT3)</b>	<b>Indikator 4:</b> Andel af radikalt prostatektomerede (pT3) patienter med positiv kirurgisk margin	Resultat	≤ 30 % bør opfylde indikatoren
<b>Morbiditet 30 dage</b>	<b>Indikator 5:</b> Andel af patienter genindlagt indenfor 30 dage efter radikal prostatektomi	Resultat	≤ 5 % bør opfylde indikatoren
<b>Postoperativ Morbiditet</b>	<b>Indikator 6:</b> Andel af radikalt prostatektomerede patienter der har været indlagt mere end 3 dage postoperativt	Resultat	≤5 % bør opfylde indikatoren
<b>Mortalitet</b>	<b>Indikator 7:</b> Andel af prostatektomerede patienter som dør indenfor 1 år efter operation	Resultat	< 1 % bør opfylde indikatoren
<b>Datakomplethed</b>	<b>Indikator 8:</b> Andel diagnosticerede patienter med PSA, kardinalsymptomer og cTNM-oplysninger angivet i DaProCadata diagnoseskemaet	Proces	≥90 % bør opfylde indikatoren

