

Indikatoroversigt, DTS					
Nr.	Indikatorområde	Indikatorbeskrivelse	Standard1 acceptabelt / ønskeligt	Datakilder	Rapporterings- niveau
1.	Deltagelse (procesmål)	Andelen af inviterede borgere der har indsendt en afføringsprøve ud af alle inviterede borgere	>45% / >65%	IAM	Nationalt Regionalt
2.	iFOBT-test (procesmål)	Andelen af analyserede afføringsprøver der er positive ud af alle analyserede prøver	Interval ]3,8 - 6,4%[	IAM	Nationalt Regionalt
3.	Compliance til kolon udredning (procesmål)	Andelen af borgere med positiv afføringsprøve der bliver koloskoperet eller CT-kolograferet ud af alle borgere med positiv afføringsprøve	>85% / >95%	IAM og LPR	Nationalt Regionalt Endoskopicer
4.	Komplet koloskopi (procesmål)	Andelen af borgere med komplet *indeks-koloskopi ud af alle borgere der får foretaget en indeks-koloskopi *initiale koloskopi efter positiv afføringsprøve	>90% / >95%	IAM og LPR	Nationalt Regionalt Endoskopicer
5.	Detektion af tarmkræft (resultatmål)	Andel af borgere med screeningsdetekteret tarmkræft (uanset stadie), ud af alle borgere der har fået lavet screeningsafledt koloskopi eller CT-colonografi	>4%	IAM, LPR og Patobank	Nationalt Regionalt Endoskopicer
6.	Detektion af tarmkræft i tidligt stadie (resultatmål)	Andel af borgere diagnosticeret med screeningsdetekteret tarmkræft*, hvor tarmkræften er diagnosticeret i tidligt stadie (UICC I og II) * kun tarmkræfttilfælde der kan genfindes i DCCG's2 database.	?	IAM, LPR, Patobank og evt. 2DCCG - database	Nationalt Regionalt Endoskopicer
7.	Interval cancer (resultatmål)	Antal interval cancer pr. 10.000 deltagere*. * borgere der har indsendt en egnet prøve og kan følges 2 år/4 år efter resultatet af prøven forelå.	?	IAM, LPR og Patobank	Nationalt Regionalt
8.	Detektion af adenomer (resultatmål)	Andelen af koloskoperede borgere med adenomer ud af alle koloskoperede borgere.	>40% / >50%	IAM, LPR og Patobank	Nationalt Regionalt Endoskopicer

9.	Komplikationer ved koloskopi (procesmål)	Andel borgere med alvorlige *komplikationer efter indeks-koloskopi ud af alle koloskoperede borgere *perforation af tarm, polypektomisyndrom, blødning eller medicinsk komplikation under koloskopi.	<0,6%	IAM og LPR	Nationalt Regionalt
10.	High grade neoplasi adenomer (procesmål)	Andel af adenomer med *high grade neoplasi ud af alle fremsendte adenomer. *Strukturel og cytologisk abnormitet, jf. definitionen i Screenings- og adenomkontrol program for tyk- og endetarmskræft, Arbejdsgruppen vedr. registrering i screeningsprogrammet for tarmkræft, Den tværregionale implementeringsgruppe vedr. tarmkræftscreening, Danske Regioner, Feb. 2014	<10%	IAM, LPR og Patobank	Nationalt Regionalt Patologiafdeling
11.	Kontrolkoloskopi (procesmål)	Andel borgere med mellem- eller højrisiko adenom, der får den anbefalede kontrolkoloskopi.	>90%	IAM, LPR og Patobank	Nationalt Regionalt
12	CT-kolonografier (procesmål)	Andel CT-kolonografier som er udført på samme dag eller dagen efter en inkomplet koloskopi	>80%	IAM, LPR	Nationalt Regionalt Endoskopcenter

<sup>1</sup>Det acceptable niveau er en minimumstandard og det ønskelige niveau er en standard, der kan stræbes efter. For flere indikatorer har det ikke været muligt at finde relevant litteratur, der kan fastlægge standarden, og standarden er derfor markeret med det et ?.

<sup>2</sup>Dansk Colorectal Cancer Group